43 Pour Lacademie de chirurgie — Anonyme

Si Entravaillant à ceprograme, ie ne me suis point proposé d'Entrer dans la maniere dont se fait linflamation, et dans le d'Etail des humeurs qui occasionnent les tumeurs, (qui paroitroit cependant necessaire puis que la matiere que nous alons traiter en sont des suites) C'est parce que c'est une matiere trop Etendüe, qui nous Eloigneroit du point que nous nous sommes proposéz, je n'en parleray meme que pour me servir de boussolle et pour Etablir purement et simplement le general des maladies de mon Exposé, Je m'attacheray seulement aux moyens de parvenir à la Certitude des operations dont les maladies sont souvent aussy peu connües que graves (je parle de celles qui Exigent l'Extirpation) et ie Consacre avec plaisir mon idée pour le bien public si elle peut luy Etre avantageuse, et si au contraire elle se trouve fausse, ie seray toujours charmé d'avoir occasion de m'apercevoir que iay mal pensé pour m'en Corriger.

Linflamation se fait ou parceque le sang arteriel à forcé le Calibre des limphatiques et y à sejourné, ou parce que ces sanguins + se sont distendus et Engorgés à l'egard des tumeurs il s'en fait de sanguines, et de limphatiques, dans l'une et

+ eux memes

Académie nationale de médecine

ARC 13 d.13 B n°20

dans l'autre de ces vaisseaux, il s'en fait encore de differentes, suivant le degré de fermentation ou elles se trouvent.

du vaisseau sanguin il peut s'en faire de sanguines, de limphatiques, et des deux ensembles en meme temps, et du limphatique de sereuse simplement, ou de la limphe et de la serosite ensemble, — de l'un et l'autre vaisseau suivant leur ouverture, s'ils sont simplement effleurez la limphe seule qui exudera de l'un, et de l'autre la simple serosité la seront de differentes humeurs; s'y au contraire les vaisseaux des deux especes se trouvent suffisamment ouverts il si fera des tumeurs differentes,

Elles peuvent encore se faire dans leurs propres vaisseaux et surtout dans les limphatiques, par raport à leurs valvules, qui facilitent à la verité la circulation dans ces vaisseaux, mais qui par la meme raison arrestent de plus en plus la liqueur lors que l'engorgement à commencé, distend les valvules, les oblige l'ors à se roidir et se fermer, ce qui forme une espece d'envelope à la liqueur, il s'en fait encore par conjection de pus -

il s'agit d'une elevation non naturelle au corps qui retient le nom de tumeur contre nature, elle fait dans ses especes le sujet de question proposée; pourquoy certains

tumeurs doivent etre Extirpeés et dautres simplement ouvertes ; dans l'une et dans l'autre de ces operations, quels sont les cas ou le Cautere est Preferable à l'instrument tranchant et les raisons de Preference

Pourquoy certaines tumeurs doivent etre Extirpeés

Les unes viennent pour lordinnaire, sans douleur, rougeur, ny pulsation, Causeés, par une limphe Epaisse tenasse et gluante arrettée peu à peu dans la glande, à mesure que l'artere limphatique en fournit et quy manquant dagent necessaire pour la fermentation lors de lengorgement fait, devient dure et jndolente, ces tumeurs retiennent le nom denkisteés simplement. Les autres au contraire Commencent par la douleur suivie de rougeur et pulsation plus ou moins prompte avec fievre et retiennent le nom dapostème

jl y en a qui doivent etre Extirpeés, soit que leur volume derange ou empeche le mouvement des parties, soit quelles les menacent de quelque Evenement facheux, — Comme leur augmentation par raport aux parties quelles pourroient Interesser, soit en Consequance de la difficulté quily auroit de parvenir à une Cure radicale, et le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Risque que Courroit le malade si on les fesoit terminer par supuration ; telles que les tumeurs squireuses quy ont aquis un degré de sensibilité et les Cancereuses, Ces Especes de maladies doivent etre Extirpées et non ouvertes, sans quoy elles jetteroient le malade dans un péril évident, ou dans la dure necessité de conserver une maladie sans Espoir de guerison. D'autres doivent etre simplement ouvertes pour donner issue a une Liqueur Epanchée ou pour decouvrir des duretés et des Calositez que la supuration doit fondre, tels sont les abcès simples et fistuleux. &

Plusieurs maladies peuvent souffrir et la destruction et Lextirpation. la tumeur simplement squireuse ou loupe peut etre emportée par le Cautère, surtout lors qu'elle est dans des parties ou la necessité du mouvement ne si trouve pas, et ou la laideur d'une Cicatrice ne derange pas Loeconnomie, La tumeur squireuse devenue douloureuse et la Cancereuse doivent etre toujours Emportées par l'instrument tranchant

En general l'instrument tranchant est Preferable au Cautère dans les cas ou on ne craint point les gros vaisseaux, l'epaisseur des teguments ny des muscles ne doivent point luy donner la preferance, car on evite dans ce cas la peine que pourroit avoir Loperateur, (en detruisant les parties) ou on suplée à sa dexterité.

le dernier ne mérite aucune attention, puisqu'on doit toujours
supposer un operateur et dextre et qu'il connoisse ce qu'il doit
eviter et ce qu'il doit couper; le cautere ne peut agir sans
detruire les parties, or il est question de decouvrir un quiste
ou de donner issue à quelque liqueur Epanchée, dans tous ces
cas on doit ménager autant qu'on peut les teguments, et
ce n'est qu'à la tumeur cancer qu'on ne la doit pas menager
s'y elle se trouve alterée. la meme raison engage l'operateur
à Eviter les caustiques qui en detruisant Enflament
toujours la peau et les parties voisines, ce qu'il faut
absolument Eviter (et qui causeroit une trop grande
deperdition de substance) tant par raport au reflux de la
matiere qui se fait alors dans le sang, que par la recidive
d'une operation sur les parties souvent alterées par ce reflux
il faut encore supposer que la matiere n'ait pas passée plus
loin que les parties qui paroissoient alterées autour de
l'Escarre. J'appelle icy recidive la peau quy s'enflame
en pareil cas qu'il faut toujours emporter et par
l'instrument tranchant, ce n'est que dans des profonds
abcès et principalement dans le cas ou on à besoin de
faire fermenter promptement l'humeur, et de faire un peu

dejour, et sur quelque legere glande quon peut placer quelques caustiques, et nintéresser quelle autant quil est Possible car sil sentrouve plusieurs linstrument est encore preferable

On me dira peutêtre que la supuration quy se fera degage le malade du soupçon dun Evenement si facheux, que le corps quy Compose la tumeur est dur et que supozant ce cas elle peut survenir a linstrument tranchant

La supuration par sa fonte ne peut tout auplus que degorger les parties visiblement enflamées autour de l'Escarre, et cette regle à encore ses Exceptions. lirritation commence des que le Cautere agit, les parties et la matiere des lors irritée occasionnent linflamation et des ce moment, quelle peut Commencer à faire refluer, Et lors que celuy quy la aplique veut sassurer de son effet, le medicament destructif layant ronge jusquau vaisseau ou la liqueur circuloit encor librement, elle en à deja transmis une partie avec elle dans le sang et par consequent occasionné une maladie generalle de particuliere quelle pouvoit Etre,

Dés que le Kiste est decouvert cést presque tout ce que demande loperation, et si le cas exige quil se fasse jour, Linstrument est encore preferable, puis quil se fait avec bien plus de surette et bien plus promptement Cést

Seulement dans le cas oules tumeurs Enveloppeés dans un Kiste et Cancer simplement sous ce nom, sont profondes que le cautere peut être mis en usage et il ne le doit que lors quon craint quelque gros vaisseau, le chirurgien artiste doit supleer àtoutes les autres difficultez. Par Linstrument tranchant on emporte tout le Kiste, outumeur tout entier et si la partie senflame, on en est quitte en faisant les remedes Convenables pour faire Cesser linflamation. Par luy on ne craint point le reflux et ses facheuses suittes que nous avons Exposé (par le Cautere) il nirritte les parties quau momment de Lextirpation on voit cequil faut Eviter et cequon doit emporter, et lors quelle est dextrement faite, on est presque seur du succez, ce quon nest pas par le Cautere quy a son effet et son lent et fort incertain.

On est presque seur par linstrument tranchant du succez de son operation par cequon voit cequelon Emporte, au lieu que par le cautere quy Consome les parties, on nest pas seur de son operation et la cure quy souvent auroit été radicale se trouve palliative; On me dira peut Etre quon Evite lhemoragie; je repondray quon est Incertain sur son Effet et quon nest pas le maitre de fixer letendue ny la profondeur de lEscarre, quy peut elle meme detruire

un vaisseau que l'operateur auroit Evité avec L'instrument, il est vray que l'Escarre permett au vaisseau de s'affessur, et que souvent lorsqu'elle tombe ce vaisseau ne donne plus de sang c'est toujours attendre son succez du hazard et la certitude est necessaire dans l'operation

D'autres doivent etre simplement ouverts. Celles quy n'exigent qu'une simple incision sont une suitte de l'inflamation causée par le sejour du sang dans son vaisseau ou dans ces vaisseau Etranger (il regarde les limphatiques comme vaisseaux Etrangers aux sanguins) qui les distendant au de là de leur tonus par la Collonne du sang quy se suit immediattement l'une apres l'autre occasionne la rougeur et la douleur quy annonce l'embarras de la liqueur dans son vaisseau, l'oblige a se crever et s'epancher dans l'intertisse des fibres ou autres lieux suivant l'endroit ou il est placé, d'ou resulte une fermentation par la limphe quy s'y trouve mellée et qui luy sert de vehicule, d'ou s'en suit la pulsation quy est le signe univoque de la liqueur Epanchée quy forme l'abcez, quy doit etre lors promptement ouvert (et par l'instrument tranchant, raison pourquoy, par le Cautere on ne fait qu'une mediocre ouverture, par l'instrument

ont a sait telle quon la veut, Or il faut voir le fondis, et panser à plat autant quil est possible, donc linstrument tranchant est preferable) par ce quel la matiere corroderoit les parties par son sejour et se feroit des fusees plus ou moins facheuses suivant le lieu ou seroit placee la tumeur et en detruiroit leconomie

La matiere peut se faire dans une partie et sepancher dans un autre, Voyons Comment.

Si linflamation est au peritoine ou aux muscles du bas ventre, elle peut se faire entre luy et les muscles, ou les membrannes qui les recouvrent et percer le peritoine— Elle peut etre dans quelque Extremité du foye ou a sa membranne Externe de meme quau peritoine, faire adherance lun avec lautre et se former un abcès entre luy et le foye

(Dans tous ces cas la matiere peut sepancher dans le ventre ou se manifester au dehors, Le sang peut encor sepancher par son propre vice en rongeant les parties par ou il passe sans distantion sorte Comme cella — arrive quelquefois, dou sen suit des aneurimes.

Lun et lautre Exigeroit chacun en particulier un

un Examin Exact dans lequil jenintreray point,
Jeme Contenteray dedire quils paument souffrir les memes
Et differentes operations pour parvenir a l'évacuation
delamatiere

Auventre et dans les abces profonds comme au [illegible] le
Cautere peut etre placé, soit afin d'Emincer la peau
(indication que linstrument peut remplir) soit afin
defaire fermenter l'tumeur. Enfin si le
Cautere a lieu, C'est seulement dans les cas oul'tumeur
ne fermente pas parce que l'irritation qu'occasionne
ce medicament à l'tumeur procure aux parties une
chaleur plus grande et par consequant vn degre plus
grand de fermentation

Dav vous tout est
Possible ce dixhuit
Septembre 1732.